

اختبارات مولدات ضد كوفيد-19 - ماذا تعني النتائج؟

معلومات عامة

- تتوفر العديد من اختبارات مولدات ضد دون وصفة طبية ولدى الحكومة الفيدرالية حاليًا برنامج للحصول على اختبارات مجانية. (راجع gov.Covidtests)
- الاختبارات تبحث عن أجزاء معينة من الفيروس. فإذا رصدتها، فإنه يكون إيجابيًا. وإن لم ترصدها، يكون الاختبار سلبيًا.
- تحدد اختبارات مولدات ضد ما إن كنت مصابًا في الوقت الراهن بكوفيد-19 أم لا. في الغالب تتطلب الاختبارات أخذ مسحات من داخل الأنف.
- لدى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وسيلة مساعدة على الإنترنت Coronavirus Self-Checker Tool لإرشادك بشأن الإجراءات التي تتخذها إذا انتابك شك في إصابتك بكوفيد-19.
- انظر الجدول التالي بشأن المواقف المعينة الخاصة باختبارات مولدات ضد كوفيد-19 وما تعنيه.

الموقف	هل أنت مصاب أعراض كوفيد-19؟	ما هي نتيجة اختبار مولد الضد الخاص بك؟	ماذا تعني نتائجك؟	ماذا يجب أن تفعل؟	ملاحظات إضافية
انت مصاب بأعراض كوفيد-19 المرضية	نعم	إيجابي	أنت مصاب بكوفيد-19 وربما تكون ناقلًا للعدوى	يجب عليك أن تعزل نفسك (تبقى في البيت) لمدة 5 أيام بعد بدء ظهور الأعراض عليك. يمكنك إنهاء العزل المنزلي إذا لم تُصب بالحمى لمدة 24 ساعة (دون استخدام أدوية خافضة للحرارة) وتحسنت الأعراض. ويجب عليك أيضًا ارتداء قناع، وتجنب السفر، وتجنب التواجد بجوار الأشخاص ذوي الخطورة العالية للإصابة وذلك لمدة 10 أيام من بدء ظهور الأعراض عليك.	راجع توجيهات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC Guidance لمزيد من المعلومات عن العزل والخطوات الأخرى الواجب اتخاذها.
أنت مصاب بأعراض كوفيد-19 المرضية	نعم	سالب	من الممكن أن تكون مصابًا بكوفيد-19، ولكن قد تحتاج إلى نوع آخر من الاختبارات	يوصى باختبار PCR. يبحث اختبار PCR عن المادة الوراثية للفيروس. إذا كان الاختبار إيجابيًا، فأنت مصاب بكوفيد-19 وتحتاج للعزل. وإن كان الاختبار سلبيًا، فإنك غير مصاب بكوفيد-19.	من المفضل أن تتحدث مع مقدم الرعاية الخاص بك بشأن موقفك.
قد قمت بمخالطة شخص ثبتت إصابته أو كان هناك احتمال إصابته بكوفيد-19	لا	إيجابي	أنت مصاب بكوفيد-19 وربما تكون ناقلًا للعدوى.	يجب عليك أن تعزل نفسك (تبقى في البيت) لمدة 5 أيام من بعد إجراء الاختبار. ويجب عليك أيضًا ارتداء قناع، وتجنب السفر، وتجنب التواجد بجوار الأشخاص ذوي الخطورة العالية للإصابة وذلك لمدة 10 أيام من إجراء الاختبار.	راجع توجيهات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC للحصول على المعلومات عن العزل.

<p>راجع توجيهات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها للحصول على المعلومات عن الحجر الصحي.</p>	<p>بسبب المخالطة، يجب عليك ارتداء قناع، وتجنب السفر، وتجنب التواجد بجوار الأشخاص ذوي الخطورة العالية للإصابة وذلك لمدة 10 أيام. وهذه نصيحة أخرى تتوقف على حالة التطعيم الخاصة بك:</p> <ul style="list-style-type: none"> • إن كنت قد استوفيت جميع لقاحات كوفيد-19، فلن تحتاج للحجر الصحي (البقاء بالبيت)، ولكن يجب إجراء الاختبار بعد 5 أيام من المخالطة إن أمكن. • إذا كان قد ثبتت إصابتك بكوفيد-19 عن طريق نتيجة اختبار إيجابية وكنت قد تعافيت من المرض من 90 يوماً مضت، فلن تحتاج إلى العزل أو إجراء الاختبار. • إذا لم تكن مستوفياً لجميع لقاحات كوفيد-19، فعليك الخضوع للحجر الصحي (البقاء في البيت) لمدة 5 أيام وإجراء الاختبار بعد 5 أيام من المخالطة إن أمكن. 	<p>لست مصاباً بكوفيد-19 في هذا الوقت، ولكنك تعرضت لشخص مصاب بكوفيد-19</p>	<p>سالِب</p>	<p>لا</p>	<p>قمت بمخالطة شخص ثبتت إصابته أو كان هناك شك في إصابته بكوفيد-19</p>
<p>من المفضل أن تتحدث مع مقدم الرعاية الخاص بك بشأن موقفك.</p>	<p>قد يوصى باختبار PCR. يبحث اختبار PCR عن المادة الوراثية للفيروس. إذا كان الاختبار إيجابياً، فإنت مصاب بكوفيد-19 وتحتاج للعزل. وإن كان الاختبار سلبياً، فإنك غير مصاب بكوفيد-19.</p>	<p>قد تكون مصاباً بكوفيد-19. قد تحتاج إلى نوع آخر من الاختبارات ومن المفضل أن تتحدث مع مقدم الخدمة الخاص بك من أجل مزيد من التوجيهات.</p>	<p>إيجابي</p>	<p>لا</p>	<p>نتيجتك لاختبار كوفيد-19 إيجابية، ولكنك لم تخالط شخصاً ثبتت إصابته أو كان هناك شك في إصابته بكوفيد-19</p>
<p>راجع مراكز التطعيم المجتمعية التابعة لوزارة الصحة في فيرجينيا.</p>	<p>إن كنت غير مستوفياً لجميع لقاحات كوفيد-19، فعليك الحصول على اللقاح والجرعة المعززة عندما تكون مؤهلاً. استمر في تنفيذ الإجراءات الوقائية الخاصة بكوفيد-19، مثل غسل اليدين باستمرار واتباع توجيهات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بخصوص ارتداء القناع.</p>	<p>أنت غير مصاب بفيروس كوفيد-19</p>	<p>سالِب</p>	<p>لا</p>	<p>لم تخالط شخصاً ثبتت إصابته أو كان هناك شك في إصابته بكوفيد-19</p>